

Antibioprophylaxie en chirurgie digestive

(SFAR 2010)

Acte chirurgical	Produit	Dose initiale	Ré injection
Pas d'ABP Coelio exploratrice Surrénalectomie Néphrectomie Curage ganglionnaire Chirurgie de la thyroïde Drainage thoracique Trachéotomie Hernies avec ou sans plaque Cholécystectomie coelio sans facteur de risque *	0	0	0
Chirurgie sus-mésocolique Œsophage sans plastie colique Chir gastroduodénale sauf GT Chirurgie pancréatique sauf DPC Chirurgie hépatique Chirurgie des voies biliaires (y compris vésicule par laparo) Cure d'événtration	Cefazoline <u>Si allergie</u> Genta et Dalacine	2 g 5 mg / kg 600 mg	1 g si > 4 H Dose unique 600 mg si > 4 H
Chirurgie sous-mésocolique Chirurgie du grêle Chirurgie colorectale Chirurgie appendiculaire** DPC et GT Plaie de l'abdomen Anastomose bilio-digestive Plastie colique Prolapsus avec ou sans matériel	Cefoxitine <u>Si allergie</u> Tibéral et Genta	2 g 1 g 5 mg / kg	1 g si > 2 H Dose unique Dose unique
Proctologie	Tibéral	1 g	Dose unique
Transplantation hépatique***	Tazocilline	4 g	2 g pendant l'anhépatie

(*) F de risque : cholécystite récente, conversion, Grossesse, immunodépression. Dans ces cas se reporter à voies biliaires

(**) Appendice normal ou macroscopiquement peu modifié. Sinon Augmentin 2 g pendant 48 H

(***) Voir prélèvements bactériologiques pré-opératoires faits (bilan pré TH). Attention BMR fréquentes