

# SI SAIGNEMENT SOUS NACO (PRADAXA<sup>®</sup>, XARELTO<sup>®</sup>)

Prendre dossier :

- 1) NOTER : âge, poids, nom du médicament, dose, nombre de prises par jour, heure de la dernière prise, indication
- 2) PRELEVER : créatininémie (clairance cockroft), NFS plaquettes, TP, TCA, fibrinogène, activité anti IIa spécifique pour Pradaxa, activité anti Xa spécifique pour Xarelto)

Si dosage des activités anti lia ou anti Xa spécifiques impossible, l'utilisation du TCA est très discutable (obtenir des dosages spécifiques en téléphonant au labo d'hémostase d'urgence 24h/24)

Tél : 80408 (ou 82236) \*

Hémorragie aigüe dans un organe critique  
(intracérébral, sous-dural aigu ou oculaire)  
.... ou menaçant le pronostic vital



CONFIDEX<sup>®</sup> (CCP) 50 UI/kg

(ou FEIBA 30 UI/kg) : non disponible à St Antoine

Hémorragie grave selon la définition  
HAS 2008 pour les AVK (hors cas précédents)



\*Si médicament < 20 ng/ml, imputabilité faible

\*Privilégier un geste hémostatique si réalisable

\*Si pas de geste hémostatique immédiat et

Si médicament > 20 ng/ml ou non connue

⇒ PPSB<sup>®</sup> 25 à 50 UI/kg renouvelable une fois

\* Rédiger sur feuille : examens **d'hématologie urgent** et préciser en « gros » dans la case surveillance du traitement anticoagulant :

soit XARELTO (dose, date de la dernière prise, activité anti Xa spécifique),

soit PRADAXA (dose, date de la dernière prise, activité anti IIa spécifique)

# DEFINITION DES HEMORRAGIES GRAVES POUR LES AVK SELON L'HAS 2008

Une hémorragie grave, ou potentiellement grave, dans le cadre d'un traitement par AVK est définie par la présence d'au moins un des critères suivants :

- Hémorragie extériorisée non contrôlable par les moyens usuels
- Instabilité hémodynamique : PAS < 90 mm Hg ou diminution de 40 mm Hg par rapport à la PAS habituelle, ou PAM < 65 mm Hg, ou tout signe de choc
- Nécessité d'un geste hémostatique urgent : chirurgie, radiologie interventionnelle, endoscopie
- Nécessité de transfusion sanguine
- Localisation menaçant le pronostic vital ou fonctionnel par exemple :
  - Hémorragie intra crânienne et intra spinale
  - Hémorragie intra oculaire et rétro orbitaire
  - Hémothorax, hémo et rétro péritoine, hémopéricarde
  - Hématome musculaire profond et/ou syndrome de loge
  - Hémorragie digestive aiguë
  - Hémarthrose

S'il n'existe aucun de ces critères, l'hémorragie est qualifiée de non grave.