

CHIRURGIE DE LA MAIN

ANTIBIOPROPHYLAXIE

PAS D'INDICATION EN GENERAL

- Pour les plaies de la main datant de moins de 48 h
- Pour les fractures fermées et ouvertes de la main
- Pour la chirurgie réglée de la main et de reprise

LES INDICATIONS POSSIBLES

INTERVENTIONS LONGUES > 2 h (réimplantation prise de lambeaux)	AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE (AUGMENTIN [®]) 2 g à l'induction puis 1 g toutes les 2 h jusqu'à la fermeture puis arrêt
Patients porteurs d'une valvulopathie Diabétiques insulinodépendants	si ALLERGIE CLINDAMYCINE (DALACINE [®]) 600 mg dans 100 ml à l'induction en 30' puis 600 mg toutes les 4 h jusqu'à la fermeture puis arrêt BMI > 35 kg/m ² → 900 mg
PROTHESE DU POIGNET	protocole IDEM PROTHESE ARTICULAIRE

CHIRURGIE DE LA MAIN

ANTIBIOTHERAPIE PREEMPTIVE

<p>Plaies contaminées majeures (parage incomplet)</p> <p>Plaies datant de plus de 48 h => bactério</p>	<p>AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE (AUGMENTIN®) 2 g à l'induction puis 1 g toutes les 2 h jusqu'à la fermeture puis 1 g/6 h en parentéral relai PO 1 g X 3/jour (jusqu'à J5)</p> <p>±</p> <p>GENTAMICINE (GENTALLINE®)* 5 mg/kg en 30' et 24 h après puis arrêt</p>
<p>Réimplantation</p> <p>Injection de liquide sous pression</p>	<p>SI ALLERGIE</p> <p>CLINDAMYCINE (DALACINE®) 600 mg dans 100 ml à l'induction en 30' puis 600 mg toutes les 6 h relai PO 600 mg X3/jour (jusqu'à J5) BMI > 35 kg/m² → 900 mg</p> <p>±</p> <p>GENTAMICINE (GENTALLINE®)* 5 mg/kg en 30' à l'induction et 24 h après puis arrêt</p>

* dosage de la gentamicinémie à J1 (concentration résiduelle avant la prochaine injection objectif < à 1 mg/l et concentration au pic 30' après la fin de la perfusion de gentamicine en 30' objectif 15 à 25 mg/l)

Si clearance de la créatinine < 50 ml/mm : dose initiale gentamicine 2 mg/kg puis dose en fonction de gentamicinémie à J1

CHIRURGIE DE LA MAIN

ANTIBIOTHERAPIE PREEMPTIVE

MORSURES ET GRIFFURES

MORSURE HUMAINE	<p>AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE (AUGMENTIN®) 2 g puis 1 g X 4/jour relai PO 1 g X 3/jour pendant 5 jours</p> <p>si ALLERGIE</p> <p>PYOSTACINE 1 g X 3/jour</p>	<p>prévention tétanos prévention VIH à discuter, sérologie VHB, VHC</p>
MORSURE CHIEN ET CHAT	<p>AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE (AUGMENTIN®) 2 g puis 1 g X 4/jour relai PO 1 g X 3/jour pendant 5 jours</p> <p>si ALLERGIE</p> <p>MOXIFLOXACINE (IZILOX®) 1 cp à 400 mg/j pendant 5 jours +</p> <p>METRONIDAZOLE (FLAGYL®) 1 cp à 500 mg X 3/j pendant 5 j</p>	<p>prévention tétanos rage à discuter</p>
MALADIE DES GRIFFES DU CHAT	<p>ZITHROMAX® 1er jour : 2 gelules à 250 mg en une prise puis 1 gelule à 250 mg pendant 4 jours</p>	<p>prévention tétanos rage à discuter</p>
TIQUE	<p>Pas de prévention recommandée pour la maladie de Lyme sauf chez la femme enceinte CLAMOXYL 500 mg X 3/jour pendant 10 jours</p>	
ROUGET DU PORC	<p>blessure par os porc, mouton ou volaille par arrête de poisson ou crustacé incubation 12 h à 48 h AUGMENTIN ou VIBRAMYCINE 200 mg/jour pendant 5 jours</p>	